

Wichtige Hinweise nach der Allergiespritze

(Spezifische Immuntherapie / SIT)

Bitte beachten Sie: Ihr Kind wird nach der Spritze mindestens 30 Minuten in der Praxis überwacht. Diese Wartezeit ist wichtig, da in dieser Zeit mögliche allergische Reaktionen am häufigsten auftreten.

Warum 30 Minuten warten?

- Systemische (allergische) Reaktionen treten meist innerhalb der ersten 30 Minuten auf.
- In sehr seltenen Fällen können Reaktionen auch später auftreten – das Risiko ist dann deutlich geringer.
- Das Praxisteam bleibt während dieser Zeit verfügbar, um sofort reagieren zu können.

Worauf Sie achten müssen (Symptome, die sofort gemeldet werden müssen)

Bitte informieren Sie das Praxispersonal sofort, wenn Ihr Kind eines der folgenden Symptome zeigt:

- Husten oder Reizhusten
- Atemnot, pfeifende Atmung
- Engegefühl in der Brust
- Schwellungen (Gesicht, Lippen, Zunge, Hals)
- Hautausschlag, Juckreiz, Quaddeln
- Starke Rötung oder Schwellung an der Einstichstelle
- Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen
- Schwindel, Herzklopfen, Bewusstseinsstörungen
- Andere ungewöhnliche Beschwerden

Warum Ihr Kind nicht alleine zur Toilette gehen darf

Falls eine allergische Reaktion im Toilettenbereich beginnt und niemand es bemerkt, kann wertvolle Zeit verloren gehen. Begleiten Sie Ihr Kind bitte immer oder sorgen Sie dafür, dass sich jemand in unmittelbarer Nähe befindet.

Schritt	Handlung
Nach der Spritze	Setzen Sie sich mit Ihrem Kind in den Wartebereich und bleiben Sie dort.
Beobachtung	Achten Sie aufmerksam auf die genannten Symptome.
Sofort melden	Beim Auftreten eines der aufgezählten Symptome sofort das Praxisteam informieren.
Toilette	Nur gemeinsam, nicht alleine.
Vor Entlassung	Abschlusskontrolle durch die Ärztin

Wenn Sie Fragen haben oder sich unsicher fühlen, sprechen Sie uns bitte jederzeit an – wir sind da, um zu helfen.

Ihr Praxisteam

Name und Geburtsdatum des Kindes: _____

Unterschrift der Eltern: _____